

## FICHA TÉCNICA

# ACCESS MOLIBDENO - COBALTO

### 1. GENERALIDADES

- a) Nombre comercial : **ACCESS MOLIBDENO- COBALTO**  
 b) Ingrediente activo : Molibdeno, Cobalto, Boro, Aminoácidos, Ácidos Policarboxílicos  
 c) Clase de uso : Fertilizante  
 d) Formulación : Líquido  
 e) Composición química :

| Descripción               | p/v     |
|---------------------------|---------|
| Molibdeno (Mo)            | 10.00 % |
| Cobalto (Co)              | 1.00 %  |
| Boro (B)                  | 0.50 %  |
| Aminoácidos Totales       | 4.00 %  |
| Carbono Orgánico Oxidable | 6.00 %  |
| Ácidos Policarboxílicos   | 9.00 %  |
| Ácidos Fúlvicos           | 8.40 %  |
| Sucratos                  | 6.00 %  |

(\*): Concentración sobre base fúlvica

### 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- a) Aspecto : Líquido  
 b) Color : Marrón  
 c) Estabilidad en almacén : Estable durante largos períodos de almacenamiento.  
 d) Tolerancia : 1% según norma RM 1035 - SAG  
 e) Densidad : 1.22– 1.28 g/mL a 25 °C  
 f) Inflamabilidad : No inflamable  
 g) pH : 3.5 – 4.5

### 3. TOXICOLOGÍA

- a) Antídoto en caso de Intoxicaciones : No tiene antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente.
- b) Precauciones para su uso : Ojos: Evite todo contacto con los ojos. Si ocurriera, lávelos con abundante agua.  
Piel: Prolongado o repetido contacto producirá irritación en la piel. Lavar la piel con abundante agua y jabón.

4. FITOTOXICIDAD : No causa fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

5. MODO DE ACCIÓN :

**ACCESS MOLIBDENO - COBALTO** es un fertilizante líquido de naturaleza órgano - mineral de acción nutricional y activadora, formulado a base de Molibdeno, Cobalto y componentes orgánicos altamente asimilables por las plantas.

**ACCESS MOLIBDENO - COBALTO** es un activador multienzimático que interviene en la translocación de azúcares hacia los órganos de reserva.

**ACCESS MOLIBDENO - COBALTO** favorece el metabolismo del Nitrógeno y su conversión en aminoácidos. Asimismo, favorece la fijación del Nitrógeno en los nódulos de las leguminosas, síntesis de aminoácidos y de algunas enzimas además de facilitar la asimilación del Hierro.

**ACCESS MOLIBDENO - COBALTO** está enriquecido con Cobalto para hacer más eficiente la síntesis de aminoácidos, proteínas y fijación del Nitrógeno en la planta.

**ACCESS MOLIBDENO - COBALTO** activa los procesos de maduración, favoreciendo la translocación desde las hojas a todos los órganos de almacenamiento (frutos, ramas, tallos y raíces).

**ACCESS MOLIBDENO - COBALTO**, cuando es aplicado vía foliar, gracias a su alta sistemicidad a su pH ácido y al contenido de materia orgánica permite el rápido ingreso del Molibdeno al interior de la planta para corregir rápidamente las carencias de este nutriente a nivel de hojas y frutos.

## 6. CUADRO DE USOS :

### Aplicaciones foliares

| CULTIVO                      | DOSIS                    | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papa                         | 200 mL/ 200 L<br>de agua | 1º aplicación cuando la planta tenga 3 - 4 hojas verdaderas. 2º aplicación, 15 días después de la 1º. 3º aplicación al llenado de tubérculos. |
| Tomate,<br>Ají,<br>Pimiento  |                          | 1º a los 15 días después del transplante. 2º a los 15 días después de la 1º aplicación. 3º al llenado de frutos.                              |
| Vid                          |                          | 1º luego del brotamiento de yemas. 2º 15 días después de la 1º. 3º al crecimiento de bayas. 4º en post cosecha.                               |
| Cebolla,<br>Ajo              |                          | 1º a los 15 días después del transplante. 2º a los 15 días después de la 1º aplicación. 3º al llenado de bulbo.                               |
| Cítricos,<br>Mango,<br>Palto |                          | 1º al inicio de brotamiento. 2º 15 días después de la 1º. 3º al llenado de frutos.                                                            |
| Arroz                        |                          | 1º a los 15 días después del transplante. 2º a los 15 días después de la 1º aplicación. 3º al llenado de grano.                               |
| Espárrago                    |                          | 1º apertura de filocladios. 2º en floración. 3º en pre agoste o llenado de corona.                                                            |

**7. MODO DE APLICACIÓN :** Se recomienda realizar aplicaciones foliares.

**8. RECOMENDACIONES :** Evitar aplicar en horas de fuerte insolación o vientos fuertes, aplicar en horas de la mañana.

**9. FORMULADOR :** **TALEX PERU SAC**  
Calle René Descartes 311, Urb. Santa Raquel, 2da Etapa, Ate. Lima – Perú.

**10. DISTRIBUIDOR :** **TALEX PERU SAC**  
Calle René Descartes 311, Urb. Santa Raquel, 2da Etapa, Ate. Lima – Perú.

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
FEBRERO 2022