FICHA TÉCNICA DE TRIO FOSFOL PLUS

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial	:	**TRIO FOSFOL PLUS**	
b) Composicion quimica	:	Nitrogeno (N) Fósforo (P_2O_5)	10 % 38%
c) Clase	:	Fertilizante foliar	
d) Formulación	:	Liquido	

2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

a) Aspecto	:	Liquido opaco
b) Apariencia	:	Opacidad
c) Color	:	Verde
d) pH (25°C)	:	5.5 - 6.5
e) Densidad	:	1.2 - 1.35 g/ml
F) Color	:	Inodoro

3. TOXICOLOGIA

a) Antídoto en caso de Intoxicaciones : No hay específico. El tratamiento será sintomático.

b) Precauciones para su uso: Mantener el envase en un lugar fresco y aireado fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

4. EFECTOS : Por su alto contenido de fósforo en la formulación estimula el desarrollo de las raíces y el crecimiento general de la planta, promueve el desarrollo rápido y vigoroso de las plantas jóvenes. Acelera la floración y fructificación.

5. MODO DE APLICACIÓN : **TRIO FOSFOL PLUS** se aplica en aspersión en mezcla con la suficiente cantidad de agua para lograr una adecuada distribución.

6. USOS Y DOSIS

CULTIVO	Dosis L/Ha	Momento de aplicación
Algodón	3	Antes de la floración y aparición de las primeras bellotas para estimular el desarrollo y fructificación
Papa	3	1° Aplicación al brotamiento uniforme 2° 14 días después de la primera 3° 14 días después de la segunda
Arroz	2	1º Después del trasplante 2º Al inicio de macollo
Cítricos, palto, Mango	8	1º Botoneo. 2º Al inicio de la floración. 3º Después del cuajado de frutos. 4ºAl inicio de desarrollo de frutos.
Manzano , Melocotonero	8	1º En yema hinchada. 2º En pre-floracion. 3º Después del cuajado de frutos.
Col, brócoli , lechuga	3	Dos semanas después del trasplante.
Páprika, tomate , pimiento,aji,marigold	3	-8 días después del trasplante. -Al inicio de cada floración.
Espárrago	3 - 5	Al trasplante, repetir cada 15 días realizar mínimo 3 aplicaciones.
Vid	4 - 6	1° al brotamiento “piña” 2° floración “cabeza de alfiler” 3° antes de la formación del racimo.
Maíz, hortalizas, frutales, ornamentales y cultivos en general	2 - 4	1º después de la emergencia. 2º durante el desarrollo vegetativo. 3º al inicio de floración.

7. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR: **TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.**

Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa - Ate
Telf. 612-6565 Fax 348-1020
Lima - Perú

DEPARTAMENTO TÉCNICO
ABRIL 2021