



UPL PERÚ SAC
GRUPO UPL

BATTUS GOLD®

INSECTICIDA AGRICOLA

INFORMACION GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Acetamiprid + Bifenthrin
NOMBRE QUIMICO	Acetamiprid: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine Bifenthrin: 2-methyl-3-phenylbenzyl (1RS)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
GRUPO QUIMICO	Acetamiprid: Neonicotinoid Bifenthrin: Pyrethroid
CONCENTRACION Y FORMULACION	Acetamiprid: 250 g/kg Bifenthrin: 250 g/kg Gránulos Dispersables (WG)
MODO DE ACCION	Sistémico, contacto
FORMULADOR	UPL Limited
TOXICIDAD	Moderadamente peligroso. Banda toxicológica amarillo LD50 Oral rata: 175 mg/Kg LD50 Dermal rata: > 2000 mg/Kg LC50 inhalación rata (mg/l) > 5.184 mg/L
ANTIDOTO	No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático
AUTORIZACION SENASA N°	PQUA N° 3180 - SENASA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

BATTUS GOLD® es un insecticida que combina el Acetamiprid con el Bifenthrin, de amplio espectro con propiedades sistémicas y de contacto. Presenta propiedades para el control de gusanos, insectos, thrips y gorgojos.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	Dosis Kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Maíz	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	0.20-0.30	-	30	0.01 (Acetamiprid) 0.05 (Bifenthrin)
	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.20-0.30	-		
Pimiento	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20-0.30	-	07	2 (Acetamiprid) 5 (Bifenthrin)
Palto	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	0.05-0.10	15	0.01 (Acetamiprid) 0.01 (Bifenthrin)
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes vorax</i>	0.30-0.40	-	35	0.01 (Acetamiprid) 0.05 (Bifenthrin)
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.30-0.40	-	21	0.02 (Acetamiprid) 0.01 (Bifenthrin)
Espárrago	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.40	-	21	0.80 (Acetamiprid) 0.01 (Bifenthrin)

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuo

UPL

www.upl-ltd.com

Fono: 611-0831

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere.

Fecha de revisión: Junio 2024

FT PQUA 3180- SENASA V-002

1/2

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Se recomienda aplicar **BATTUS GOLD®** (i.a. Acetamiprid + Bifenthrin) de la siguiente manera:

- Maíz: No más de 3 aplicaciones por campaña considerando dos campañas por año.
- Pimiento: No más de 2 aplicaciones por campaña considerando dos campañas por año.
- Palto y Papa: No más de 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año.
- Cebolla y Espárrago: No más de 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación. En caso de ingresar antes de las 24 horas se debe usar ropa de protección.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. **BATTUS GOLD®** no es oxidante por naturaleza.

FITOTOXICIDAD

BATTUS GOLD® no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

® Marca Registrada