

## Fungicida biológico de efecto preventivo y curativo contra la *botrytis*.

N° registro  
111 - SENASA  
PBA-ACBM

### Descripción

Fungicida biológico de efecto preventivo y curativo contra la botrytis, formulado con base en una cepa mejorada de *Bacillus subtilis* de última generación y de coformulantes líquidos especialmente seleccionados por sus efectos sinérgicos con los microorganismos.

Desarrollado con la tecnología de formulación Bioevology®, exclusivamente desarrollada por Rovensa Next, que maximiza los efectos fungicidas del producto mediante un proceso de fermentación y producción optimizada del microorganismo en condiciones controladas y con un balance óptimo y único, que maximiza el efecto del producto contra botrytis.

### Principales beneficios

- Controla eficazmente los hongos causantes de botrytis en cultivos como uva y arándano.
- Efecto preventivo y curativo específico, gracias a su tecnología de formulación Bioevology®
- Aumenta la capacidad de respuesta de la planta ante el estrés biótico.

### Especificaciones técnicas

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bacillus subtilis<br>(cepa IAB/BS03)<br>(garantizado $1,4 \times 10^7$ UFC/g) | 1,6 g/L |
| Aditivos c.s.p                                                                | 1 L     |

## Dosis y métodos de uso

| Cultivo                                                                    | Plaga            |                     | Dosis     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                                                                            | Nombre común     | Nombre científico   | L/200 L   | L/ha      |
| Arándano                                                                   | Moho gris        | Botrytis cinérea    | 0.5       | 1.5       |
| Vid                                                                        | Pudrición blanda | Rhizopus stolonifer | 0.5 - 0.6 | 2.0- 2.5  |
| Vid                                                                        | Moho gris        | Botrytis cinérea    | 0.5 - 0.6 | 2.0 - 2.5 |
| PC: Período de carencia - LMR: Límite Máximo de Residuos - N.A.: No aplica |                  |                     |           |           |

Se aplica foliarmente cuando aparecen los primeros síntomas de enfermedad. Se recomienda aplicar de 2 a 3 veces por campaña a intervalos de 10 a 15 días entre aplicación.

### Fitotoxicidad

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

### Almacenamiento

No almacenar en zonas de temperatura demasiado elevada.

### Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de productos, evitar productos ácidos o alcalinos fuertes.

### Toxicología

No es tóxico, ni selectivo.  
No produce residuos en los frutos y vegetales.