

## PODASTIK MAX®

## FUNGICIDA AGRICOLA

### INFORMACION GENERAL

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGREDIENTE ACTIVO          | Tebuconazole                                                                                                     |
| NOMBRE QUIMICO              | (RS)-1- <i>p</i> -clorofenil-4,4dimetil-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol.                     |
| GRUPO QUIMICO               | Triazoles                                                                                                        |
| CONCENTRACION Y FORMULACION | 0.5% p/v (5 g/L) Pasta (PA).                                                                                     |
| MODO DE ACCION              | Control preventivo                                                                                               |
| FORMULADOR                  | Renner Coatings Chile SpA                                                                                        |
| TOXICIDAD                   | Ligeramente peligroso. Banda toxicológica azul<br>LD50 Oral rata: > 3000 mg/Kg<br>LD50 Dermal rata: > 4000 mg/Kg |
| ANTIDOTO                    | No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático                                                      |
| AUTORIZACION SENASA N°      | PQUA N° 3286 - SENASA                                                                                            |

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**PODASTIK MAX®** es un fungicida que se utiliza para el control preventivo de enfermedades causadas por hongos de la madera en cultivos frutales, según las instrucciones de la etiqueta y esta ficha técnica. **PODASTIK MAX®** ha sido formulado como una pasta fungicida para ser aplicado directa e inmediatamente sobre los cortes de poda recién efectuados, evitando así la entrada de hongos que afectan a la madera.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

| Cultivo  | Plaga              |                                 | Dosis<br>L/Ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común       | Nombre Científico               |               |                |                 |
| Palto    | "Muerte regresiva" | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 4             | NA             | 0.02            |
| Vid      | "Muerte regresiva" | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 4             | NA             | 0.5             |
| Arándano | "Muerte regresiva" | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 4             | NA             | 1.5             |
| Naranja  | "Muerte regresiva" | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 4             | NA             | 0.4             |

PC: Período de carencia

NA: No aplica

LMR: Límite máximo de residuo

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Se recomienda realizar una aplicación en los cultivos de palto y vid. El momento de aplicación es la etapa de poda.

### PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección personal adecuado.

### COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidad con otros productos.

## FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada



Realice el triple lavado de los envases  
y elimine en los centros de acopio  
Autorizados de Campo Limpio.

[www.campolimpio.org.pe](http://www.campolimpio.org.pe)