

FICHA TECNICA DE KANAK®

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial	:	KANAK®
b) Ingrediente activo	:	Carbendazim
c) Clase	:	Fungicida
d) Grupo químico	:	Benzimidazoles
e) Formulación	:	Suspensión Concentrada (SC)
f) Composición química	:	Carbendazim 500 g/L
	:	Aditivos c.s.p 1 L

2. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS

a) Aspecto	:	Líquido fluido
b) Color	:	Blanco
c) Olor	:	Inodoro
d) Estabilidad en almacén	:	Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento
e) pH	:	5-8
f) Densidad	:	Aproximadamente 1,15 (20°C)
g) Compatibilidad	:	KANAK® Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o a la empresa proveedora

3. TOXICOLOGIA

Oral DL ₅₀	>2000 mg/kg
Dermal LD ₅₀	>4000 mg/kg
Inhalación LC ₅₀	>5.0 mg/L
Irritación ocular	No irritante ocular
Irritación de la piel	No irritante dermal

a) Categoría toxicológica	Ligeramente peligroso - CUIDADO
b) Antídotos en caso de Intoxicaciones	: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
c) Precauciones para su uso	: Lea bien la etiqueta y asegúrese de comprenderla antes de usar el producto. Conserve el producto en su envase original en buen estado, etiquetado y cerrado. Use siempre equipos de aplicación en buenas condiciones que no tengan fugas o escapes, con las boquillas en perfectas condiciones. No coma, beba ni fume durante su preparación y aplicación.

Después de su aplicación báñese con abundante agua y jabón. Cámbiese de ropa. Evite su almacenamiento y/o transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Use máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

4. MODO DE ACIÓN

KANAK® es un fungicida sistémico, con acción protectora y curativa.

5. MECANISMO DE ACCION :

KANAK® actúa inhibiendo el desarrollo de los tubos germinativos, la formación de apresorios y el crecimiento micelial del hongo.

6. FITOTOXICIDAD :

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en la etiqueta del producto.

7. MODO DE PREPARACIÓN :

KANAK® se emplea haciendo una premezcla, según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

8. FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN :

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda usar con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción. Realizar 1 aplicación de Carbendazim por campaña al año como máximo.

9. USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	0.7 - 1.0	7	0.1
	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.3 – 0.4	-	14	0.1
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 – 0.4	-	2	0.1
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.20 – 0.25	-	5	0.1
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 – 0.30	-	21	0.01
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 – 0.35	-	7	0.5

P.C. = Periodo de Carencia.

L.M.R. = Límite Máximo de Residuos.

10. PERIODO DE REINGRESO : 24 horas después de aplicado el producto.

11. N° DE REGISTRO : PQUA N° 3231-SENASA

12. TITULAR DE REGISTRO : TALEX PERÚ SAC

13. DISTRIBUIDOR : TALEX PERÚ SAC
Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel 2ª Etapa - Ate Lima - Perú

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Abril 2025